

## Risicogroepen

- Kinderen met diabetes
- Kinderen met hartziekten
- Kinderen met longaandoeningen
- Kinderen met nieraandoeningen
- Kinderen van wie het immuunsysteem verzwakt is
- Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie
- Kinderen met ernstige meervoudige chronische aandoeningen
- Kinderen onder behandeling van hoge dosissen corticosteroiden namelijk hoger dan 20mg per dag prednisolone
- Kinderen met onstabiele CF and non-CF bronchiectasieën
- Kinderen met onstabiel ernstig astma met nood aan hoge dosis systeemcorticoiden of biologicals
- Kinderen met chronische zuurstoftherapie
- Kinderen met chronische niet invasieve beademing
- Kinderen met onstabiele congenitale longen/luchtwegaandoeningen
- Kinderen met PID met ernstige gecombineerde immuunstoornis ((S)CID of ernstige lymfopenie
- Kinderen met PID en ernstig longpijpen
- Kinderen die PID patiënten zijn die een stamceltransplantatie of genterapie zullen krijgen of gekregen hebben minder dan één jaar geleden of langer indien extra behandeling nodig is
- Kinderen na een harttransplantatie
- Kinderen met pulmonale hypertensie
- Kinderen met ernstige hartfalen
- Kinderen die in de afgelopen zes weken rituximab of eculizumab hebben toegediend gekregen of bij wie toediening van deze medicatie wordt gepland in de komende weken
- Kinderen die in het afgelopen jaar (langer dan 6w geleden) rituximab of eculizumab hebben toegediend gekregen
- Kinderen onder behandeling met dialyse of plasmaferese
- Kinderen bij wie atypisch hemolytisch uremisch syndroom werd vastgesteld
- Kinderen met vaak recidiverend of steroid afhankelijk nefrotisch syndroom
- Kinderen onder intensieve behandeling of na allogene stamceltransplantatie (+/- 12 maanden of langer, afhankelijk van de duur van de immuunonderdrukkende behandeling
- Broers en zussen van een risicopatiënt